

Инструкция

по практическому использованию фасованной минеральной природной лечебно-столовой воды «Бишули» при внутреннем применении

Бишули
КРЫМСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

I. Методика приема минеральной воды:

Заболевания	Назначение	Количество	Температура, °С	Продолжить лечения
При хроническом гастрите типа В с повышенной кислотообразующей и секреторной функцией желудка и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.	за 60 минут до еды, 3 раза в день. Воду следует пить медленно, небольшими глотками.	1-3 день – 100 мл на прием, с 4-го дня – 180-200 мл на прием	+28...+35	21-30 дней
При хроническом гастрите типа В с нормальной кислотообразующей и секреторной функцией желудка.	за 40 минут до еды, 3 раза в день Воду следует пить медленно, небольшими глотками.	1-3 день – 100 мл на прием, с 4-го дня – 180-200 мл на прием	+28...+35	21-30 дней
При хроническом бескаменном холецистите.	за 40 минут до еды, 3 раза в день	200-250 мл на прием	+30...+35	21-30 дней
При хроническом колите и синдроме раздраженного кишечника с наличием поносов.	2 раза в день, кроме утреннего приема	100 мл на прием	+45...+55	21-30 дней
При хроническом колите и синдроме раздраженного кишечника с наличием запоров.	3 раза в день	200 мл на прием	+18...+24	21-30 дней
Во всех остальных случаях, в том числе при нарушении неспецифических адаптационных реакций.	за 40-60 минут до еды, 3 раза в день	1-й день – 50 мл на прием, 2-й день – 100 мл на прием, с 3-го дня – 200 мл на прием	+28...+35	21-30 дней

II. Показаниями к питьевому применению хлоридно-гидрокарбонатной натриевой воды малой минерализации «Бишули» являются следующие состояния:

- хронические гастриты типа В с повышенной и нормальной кислотообразующей функцией желудка в стадии затухающего обострения, неустойчивой и стойкой ремиссии;
- хронические калькулезные холециститы в стадии затухающего обострения, неустойчивой и стойкой ремиссии;
- хронические колиты и синдром раздраженного кишечника в стадии затухающего обострения, неустойчивой и стойкой ремиссии;
- состояния, сопровождающиеся угнетением неспецифических адаптационных реакций.

III. Противопоказаниями для приема фасованной минеральной природной лечебно-столовой воды «Бишули» являются следующие состояния:

- обострения воспалительного процесса в желудке и кишечнике, печени и поджелудочной железе, сопровождающиеся рвотой, тошнотой, кровотечением, резким болевым синдромом;
- желчнокаменная болезнь и острый холецистит, требующий хирургического лечения;
- нарушения прохождения пищевых масс желудочно-кишечным трактом (сужение пищевода и привратника, резко выраженный гастроптоз);
- мочекаменная болезнь, которая требует хирургического лечения;
- резко выраженная недостаточность кровообращения;
- осложненные состояния после оперативного вмешательства на органах пищеварения по поводу злокачественных новообразований.